



ACTINOPHARMA FT

Registro SAGARPA: 0-0085-010

Combinación antibiótica de amplio espectro.

Uso veterinario





FÓRMULA:

Cada 1000 g contiene:

Florfenicol	40	g
Tilosina fosfato		_
Excipiente c.b.p 10	00	g

Uso en: Cerdos y aves.

Descripción:

ACTINOPHARMA FT reúne en su formulación dos antibióticos cuya eficacia en problemas de difícil solución ha sido probada en todo el mundo y ante múltiples casos de aves y cerdos en todas las edades.

Florfenicol:

Antibiótico semisintético resultado de los estudios relativos a la modificación de los radicales relacionados con la anemia aplásica ocasionada por el cloranfenicol (substitución de un radical Nitro por un Metilsulfonil, además de un radical hidroxil del tercer carbono por una molécula de flúor) dichos cambios lo convierten en uno de los antibióticos más seguros hasta hoy conocidos.

Su Concentración Mínima Inhibitoria para los microorganismos sensibles es la más baja para cualquiera de los fenicoles existentes además de que su vida media es mayor que todos, esto permite desarrollar mayor persistencia y difusión dentro del organismo y por ende mejores tratamientos.

Tilosina:

Uno de los antibióticos de mayor uso en medicina veterinaria que ha demostrado eficacia en todos los casos de afecciones bacterianas de todas las especies animales, de naturaleza macrólido con características antimicoplásmicas y de espectro reducido se absorbe fácilmente por vía intestinal ya sea administrado en el agua o el alimento se distribuye preferentemente en tejidos del árbol respiratorio, además de hígado, músculo y pulmón. Su eliminación es por vía renal y se biotransforma en hígado y tejidos.

Indicaciones:

ACTINOPHARMA FT se ha formulado logrando una asociación sinérgica de amplio margen de eficiencia y seguridad que puede ser usado tanto en programas Metafilácticos para control de ECR como en el caso de CRP así como para el tratamiento de las afecciones en su fase más aguda.

Vía de administración: Oral, mezclado en el alimento.





ACTINOPHARMA FT

Registro SAGARPA: Q-0085-010

Dosis:

AVES:

Como Programa Metafilactico: Administrar de 1 a 3 kg de ACTINOPHARMA FT por tonelada de alimento de acuerdo al programa establecido y a la severidad con que aparecen los síntomas en la granja.

Pollos de engorda: Administrar 1 kg de ACTINOPHARMA FT por tonelada de alimento, del día 7 al 14 y del día 28 al día 31 de edad, pudiendo variar de acuerdo al historial clínico de la granja.

Posturas ligeras y pesadas: Administrar 1 kg de ACTINOPHARMA FT por tonelada de alimento, durante 7 días de la semana 6ª, 16ª / 19ª (pesadas), 20ª / 24ª (pesadas) y un tratamiento al mes hasta terminar el periodo del pico de producción.

Cuadros agudos: Administrar 2 kg de ACTINOPHARMA FT por tonelada de alimento, en todas las aves en estados agudos de enfermedad, medicar durante 5 a 7 días continuos.

CERDOS:

Complejo respiratorio: Administrar de 1 a 2 kg de ACTINOPHARMA FT por tonelada de alimento, durante 7 a 15 días para el control metafiláctico, en etapas críticas de la engorda, destete, bajada al piso, etc.

Reproductoras: Administrar 1 kg de ACTINOPHARMA FT por tonelada de alimento durante toda la lactancia.

Advertencias:

- No utilizar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No consumir productos de origen animal, sino hasta después de 5 días del último tratamiento.
- Consérvese en lugares frescos y secos, no expuestos a la luz solar directa.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Producto exclusivo para medicina veterinaria.

Consulte al Médico Veterinario.

Presentación: Saco de 25 Kg.

Hecho en México para:
Starpharma S. de R.L. de C.V.
Remanso de las Nochebuenas
No. 183 Ciudad Bugambilias
C.P. 45237
Zapopan, Jal., México.
www.starpharma.com.mx