



DICLOSTAR

Registro SAGARPA: Q-9172-015

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Uso veterinario



FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

Diclofenaco sódico 50 mg

Vehículo c.b.p. 1 mL

Uso en: Bovinos y porcinos.

Descripción y farmacodinamia:

DICLOSTAR es derivado del ácido Fenilacético, que funciona como agente antiinflamatorio con propiedades analgésicas y antipiréticas, al inhibir la síntesis de las prostaglandinas, que desempeñan una acción importante respecto a la aparición de la inflamación, dolor y fiebre; así como, la hialuronidasa producida por gérmenes patógenos y la agregación plaquetaria.

DICLOSTAR se absorbe con rapidez y por completo después de su administración intramuscular, obteniendo concentraciones plasmáticas proporcionales a la dosis aplicada, se distribuye por todo el organismo y se fija en las proteínas plasmáticas, en el líquido sinovial presenta concentraciones adecuadas que permanecen por mayor tiempo, que en el plasma.

Se metaboliza por hígado y se excreta por bilis en las heces y por orina en forma de metabolitos.

Indicaciones:

DICLOSTAR, por ser un antiinflamatorio, no esterooidal con potente actividad analgésica y antipirética, recomendado para todos los casos que cursen inflamación, dolor y fiebre de vacas, vaquillas, becerras, ovinos y caprinos.

Solución inyectable

Literatura exclusiva para el médico veterinario.



DICLOSTAR

Registro SAGARPA: Q-9172-015

Dosis:

Bovinos y Porcinos:

2.5 mg de diclofenaco por cada Kg de peso corporal (equivalente a 1 mL por cada 20 Kg de peso corporal) por día, durante 1 a 3 días.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Advertencias:

- No se administre este producto 7 días antes de sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No se administre este producto a bovinos cuya leche es destinada al consumo humano hasta 7 días después de haber terminado el tratamiento.
- Manténgase en lugar fresco y protegido de la luz, a menos de 25°C.
- No congelar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y/o animales domésticos.
- Deseche el envase vacío y/o sobrante de acuerdo a las normas ecológicas de la región.

Consulte al Médico Veterinario.

Presentación: Frascos de 100 mL ó de 250 mL.

Hecho en México por:
Starpharma S. de R.L. de C.V.
Av. 8 de Julio
2166-2, Col. San Sebastianito
C.P. 45601
Tlaquepaque, Jal., México.
www.starpharma.com.mx
(33) 3797 7393

Solución inyectable
Literatura exclusiva para el médico veterinario.