



IVERSTAR F

Registro SAGARPA: Q-9172-008

Endectocida y fasciolicida

Uso veterinario



FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina 1 g

Clorsulón 10 g

Vehículo c.b.p. 100 mL

Uso en: Bovinos y ovinos.

Descripción:

IVERSTAR F presenta fuerte acción endectocida, está formulado a base de Ivermectina y Clorsulón en solución inyectable lista para su uso; la Ivermectina, es un endectocida de amplio espectro, su mecanismo de acción es de efecto paralizante en los parásitos, que finalmente mueren; esta acción elimina eficazmente a los nematodos gastrointestinales y pulmonares, así como a los ácaros de la sarna y piojos chupadores de sangre; el Clorsulón, se caracteriza por privar de la fuente principal de energía metabólica a los parásitos trematodos, que finalmente mueren, controla eficazmente a la Fasciola hepática adulta y provee un significativo control en Fasciola hepática inmadura (de 8 ó más semanas de edad), así como a Fasciola gigantica, a la misma vez controla a los nematodos gastrointestinales, pulmonares y algunos ectoparásitos, en los bovinos.

Indicaciones y Usos:

IVERSTAR F, está indicado para el control eficaz tanto en parásitos internos como en parásitos externos, como los cuasantes de la sarna y los piojos, tiene acción de prolongada eficacia contra parásitos gastrointestinales y pulmonares, incluyendo fasciola hepática adulta.

Solución inyectable

Literatura exclusiva para el médico veterinario.



IVERSTAR F

Registro SAGARPA: Q-9172-008

Dosis:

BOVINOS:

1 mL por cada 50 Kg de peso vivo.

OVINOS:

0.5 mL por cada 25 Kg de peso vivo.

Vía de administración: Subcutánea.

Advertencias:

- NO debe administrarse este producto en bovinos 35 días y en ovinos 42 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- Prohibido el uso de este producto en el control de Garrapata *Boophilus SPP*.
- No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto en bovinos hasta 35 días y en ovinos 42 días después de la última aplicación.
- Este producto no se debe de utilizar ni intravenosa ni intramuscularmente.
- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD AMBIENTAL: debido a la toxicidad que representan la Ivermectina para los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deberán desecharse en forma segura enterrándolos o incinerándolos.

Presentación: Frasco de 100 mL.
Frasco de 500 mL.

Hecho en México por:
Starpharma S. de R.L. de C.V.
Remanso de las Nochebuenas
No. 183 Ciudad Bugambillas
C.P. 45237
Zapopan, Jal., México.
www.starpharma.com.mx

Solución inyectable
Literatura exclusiva para el médico veterinario.