



**SINCROSTAR**  
Registro SAGARPA: Q-9172-005

**Agente luteolítico sincronizador de celos en bovinos y  
sincronizador de parto en cerdas.**

#### Uso veterinario



#### FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

D-Cloprostenol ..... 75 µg

Vehículo c.b.p. .... 1 mL

**Uso en:** Bovinos y cerdos.

#### Descripción:

**SINCROSTAR**, es una solución estéril inyectable ya lista para su uso, está formulado en base a D-Cloprostenol, prostaglandina sintética análoga y estructuralmente relacionada con la prostaglandina PG-F2 alfa, su acción produce un efecto luteolítico y uterotónico, que ayuda a incrementar el tono muscular y estimular las contracciones del miometrio.

#### Indicaciones:

Prostaglandina sintética indicada en:

#### CERDAS:

Programación del parto.

#### VACAS:

Interrupción de la gestación.

Inducir el estro.

Programación del parto.

Tratamiento de piometra, endometritis crónica, feto momificado.

**Solución inyectable**

Literatura exclusiva para el médico veterinario.



# SINCROSTAR

Registro SAGARPA: Q-9172-005

## Dosis:

### CERDAS:

Una dosis de 75 microgramos de D- Cloprostenol (1 mL), administrando 2 días o menos antes de la fecha programada de parto, el parto ocurre generalmente 36 horas después de la inyección.

### VACAS:

**Para el tratamiento de piometría, endometritis crónica, feto momificado** (se requiere asistencia manual para sacarlo de la vagina)

Una dosis de 150 microgramos de D-Cloprostenol (2 mL)

**Para programar el estro:** Una dosis de 150 microgramos de D-Cloprostenol (2 mL) después de diagnosticar la presencia del cuerpo lúteo por palpación rectal.

Las hembras tratadas que muestren celo pueden ser inseminadas una sola vez a las 72 horas o 2 veces a las 72 y 96 horas después de la administración; el servicio a las hembras se realizará con 1 o 2 inseminaciones, según lo señalado anteriormente.

**Para interrupción de la gestación - de una semana después de la inseminación a los 150 días de la gestación:**

Una dosis de 150 microgramos de D-Cloprostenol (2 mL). El aborto ocurre de 4 a 5 después de la administración.

**Vía de administración:** Inyección intramuscular profunda.

## Advertencias:

- **No se administre este producto a bovinos cuya leche es destinada al consumo humano, hasta 24 horas después de haber terminado el tratamiento.**

- **No administrar en animales gestantes a menos que se desee el aborto. Evitar el manejo por mujeres embarazadas o en edad fértil y en personas asmáticas.**

**Tiempo de retiro:** No se administre este producto 24 horas antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

- Manténgase en un lugar fresco y seco por debajo de 25°C, protegido de la luz solar directa.

- Deseche el envase vacío o el sobrante de acuerdo a las normas ecológicas de la región.

**Manténgase fuera del alcance de los niños y/o animales domésticos.**

**Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.**

**Presentación:** Frasco de 20 mL.

Hecho en México para:  
Starpharma S. de R.L. de C.V.  
Av. 8 de Julio  
2166-2, Col. San Sebastianito  
C.P. 45601  
Tlaquepaque, Jal., México.  
www.starpharma.com.mx  
(33) 3797 7393

**Solución inyectable**  
Literatura exclusiva para el médico veterinario.